EXELON® PATCH (RIVASTIGMINE TRANSDERMAL SYSTEM)
রোগীর ডায়েরী
(ব্যবহারের নিয়মাবলী এবং ঔষধ সেবনের রেকর্ড)

এই তথ্য EXELON® PATCH -এর নিরাপদ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য

EXELON® PATCH (RIVASTIGMINE TRANSDERMAL SYSTEM) এর ব্যবহার বিধি^{১,২}

- এই তথ্য Exelon Patch-এর নিরাপদ কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

মনে রাখা প্রয়োজন

- নতুন Patch ব্যবহারের পূর্বে পুরাতন Patchিটি তুলে ফেলুন।
- প্রতিদিন কেবলমাত্র একটি Patch ব্যবহার করুন।
- Patchিট কেটে টুকরো করবেন না।
- হাতের তালু দিয়ে Patchিট যথাস্থানে লাগিয়ে কমপক্ষে ৩০ সেকেন্ড আলতভাবে চেপে রাখুন।

কিভাবে লাগাবেন

- নতুন Patch লাগানোর পূর্বে যত্নসহকারে পুরনো Patchটি তুলে ফেলুন।
- নতুন Patchিট পাশের ছবির মতো করে মোডক থেকে বের করুন।
- Patchিটর এক পার্শ্বের Protective
 Linerিট তুলে ফেলুন।
- Patchিট আপনার পিঠের উপরাংশে অথবা নিয়াংশে, বুকের উপরাংশে অথবা বাহুর উপরাংশে (ছবিতে প্রদর্শিত) লাগিয়ে অবশিষ্ট Protective Linerিট তুলে ফেলুন।
- ৫. Patchিটি যথাস্থানে লাগান এবং আলতভাবে কমপক্ষে ৩০ সেকেভ চাপ দিয়ে ধরে রাখুন।











কোথায় লাগাবেন

নতুন Patchিট লাগানোর আগে পূর্বের Patchিট তুলে ফেলুন।

প্রত্যহ একটি করে Patch নিম্নের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

সামনে







পিছনে










কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone


প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch
 লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্বারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone
 (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের প্রামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone

প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।


আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

- Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet.
 [For Placement Only—Please update with your local references]
- Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet.
 [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch
 লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্বারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone
 (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।

সামনে অথবা সিছনে

Application Zone

প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।


আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotিটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।




প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।




প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone


প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch
 লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone
 (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের প্রামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone

প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।


আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch
 লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্বারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের প্রামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone

প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।


আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotিটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।




প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch
 লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্বারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের প্রামর্শ গ্রহণ করুন।



Application Zone

প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।


আপনি Patch লাগানোর জন্য একটি স্থানই কয়েকবার ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন ঠিক একই Spotিটি প্রত্যহ ব্যবহার করা না হয়।

- Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet.
 [For Placement Only—Please update with your local references]
- Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

কিভাবে এই রেকর্ডশিটটি ব্যবহার করতে হবে

- এই রেকর্ডশিটটিতে আপনি কখন একটি Exelon Patch লাগালেন বা তুললেন তার সময় লিপিবদ্ধ করুন।
- যখন পুরাতন Patch টি তুলে ফেলবেন তখন নির্ধারিত স্থানে একটি টিক চিহ্ন দিন।
- নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন ও তারিখ পুরণ করুন।
- নতুন Patchিট কোথায় লাগালেন তা Application Zone (Letters)-এর ঘরটিতে লিখুন।
- যদি আপনার কোন প্রশ্ন থাকে অথবা আরও তথ্যের প্রয়োজন হয় তবে ঔষধের মোড়কের ভিতরের নির্দেশনা পত্রটি পড়ন।
- আপনি যদি কোন ব্যাপারে নিশ্চিত না হন, তবে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন।



প্রত্যহ একটি করে নতুন Patch বাম পাশের ছবিতে প্রদর্শিত (A অথবা B অথবা C অথবা D অথবা E অথবা F অথবা G অথবা H) যে কোন একটি স্থানে লাগান।

- 1. Exelon Patch (rivastigmine transdermal system) Patient Leaflet. [For Placement Only—Please update with your local references]
- 2. Exelon Patch (rivastigmine) Prescribing Information

পুরাতন Patchিট কি অপসারিত?	নতুন Patchিট ব্যবহারের তারিখ	নতুন Patchিট ব্যবহারের দিন	নতুন Patch-এর Application Zone (Letter)
উদাহরণ ঃ	২৮ জুলাই ২০১৪	সোমবার	A

Prescribing Information:

Presentation: Exelon® Patch 5 contains 9 mg rivastigmine. The release rate is 4.6 mg/24 h. Exelon Patch 10 contains 18 mg rivastigmine. The release rate is 9.5 mg/24 h. Exelon Patch 15 contains 27 mg rivastigmine. The release rate is 13.3 mg/24 h, **Indication**: Mild to moderately severe dementia associated with Alzheimer's disease, severe dementia associated with Alzheimer's disease or mild to moderately severe dementia associated with Parkinson's disease. Dosage regimen and administration: In patients with mild to moderately severe dementia associated with Alzheimer's disease or associated with Parkinson's disease: Initiation and re-initiation of therapy should start with one Exelon Patch 5 each day. If well tolerated, it may be increased after a minimum of 4 weeks of treatment to one Exelon Patch 10 each day which is the recommended effective dose. Patients treated by Exelon capsules or oral suspension with a maintenance dose of 6 to 12 mg may be switched to Exelon Patch 10. Some patients may benefit from higher dose, in this case the dose can be titrated up to Exelon Patch 15 and then up to Exelon Patch 20. A minimum of 4 weeks of treatment and good tolerability with the previous dose should be observed before titrating up to higher doses. In patients with severe dementia associated with Alzheimer's disease: Treatment is started with Exelon Patch 5 once a day. Subsequently the dose should be increased to Exelon Patch 10 and then to Exelon Patch 15 which is the demonstrated effective dose. These dose increases should always be based on good tolerability of the current dose and may be considered only after a minimum of four weeks of treatment at each dose level. Not recommended in children. Contraindications: Now hypersensitivity to rivastigmine, other carbamate derivatives, or other ingredients of the formulation. •Previous history of application site reactions suggestive of allergic contact dermatitis with rivastigmine transdermal patch. Warnings and precautions: Medication misuse and dosing errors with Exelon transdermal patch (e.g., not removing the old patch when putting on a new one and the use of multiple patches at one time) have resulted in serious adverse reactions; some cases have required hospitalization, and rarely led to death. Patients and their caregivers must be instructed on important administration instructions for Exelon transdermal patch. If treatment is interrupted for longer than three days, treatment should be re-initiated with Exelon Patch 5. Gastrointestinal adverse effects have been observed at initiation of therapy and shortly after dose increase. Caution in case of prolonged vomiting or diarrhea (risk of dehydration). Extrapyramidal symptoms may be induced or exacerbated by cholinomimetics and worsening of parkinsonian symptoms (particularly tremor) has been observed in patients with Parkinson's disease treated with rivastigmine. Adverse effects may respond to removing the patch. If they persist, the daily dose should be temporarily reduced to the previous welltolerated dose. Patient's weight should be monitored during therapy with Exelon Patch. Electrocardiogram QT prolongation may occur in patients treated with certain cholinesterase inhibitor products including rivastigmine. Rivastigmine may cause bradycardia which constitutes a risk factor in the occurrence of torsade de pointes, predominantly in patients with risk factors. Caution is recommended in patients at higher risk of developing torsade de pointes. Clinical monitoring may also be required. As with other cholinomimetics, caution is recommended in patients with sick sinus syndrome, conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block), gastroduodenal ulcerative conditions, history of or current respiratory disease, urinary obstruction, and seizures in predisposed patients. In case of disseminated skin hypersensitivity reactions with the use of rivastigmine, treatment should be discontinued. Use of rivastigmine patch may lead to allergic contact dermatitis, in this case treatment should be discontinued and patients should be switched to oral rivastigmine only after negative allergy testing and under close medical supervision. Some patients sensitized by exposure to rivastigmine patch may not be able to take rivastigmine in any form. Caution in patients with clinically significant hepatic impairment Caution in patients with body weight below 50 kg: carefully titrate and monitor these patients for adverse reactions (e.g., excessive nausea or vomiting) and consider reducing the dose if such adverse reactions develop. Pregnancy, lactation, females and males of reproductive potential: The safety of Exelon Patch is not established in pregnant and breast-feeding women. •Exelon Patch should only be given to pregnant women if the potential benefit outweighs the potential risk for the fetus. •Should not breast-feed. Adverse drug reactions: Very common (>10%); nausea. Common (>1 to <10%); vomiting, anorexia, decreased appetite, anxiety, depression, insomnia, dizziness. headache, diarrhoea, dyspepsia, abdominal pain, urinary incontinence, application site reactions (erythema*, pruritus*, oedema*), fatigue, asthenia, weight decrease, urinary tract infection. (*very common in Japanese patients). Uncommon (≥0.1 to <1%): dehydration, agitation, delirium, hallucinations, aggression, cerebrovascular accident, syncope, somnolence**, psychomotor hyperactivity, cardiac arrhythmia (e.g., bradycardia, supraventricular extrasystole), gastric ulcers, gastrointestinal haemorrhage, hyperhidrosis, contact dermatitis*, malaise. (*very common in Japanese patients. **common in Chinese patients). Rare (>0.01 to <0.1%): hypertension, application site hypersensitivity, pruritus, rash, erythema, urticaria, blister, dermatitis allergic, fall. Very rare (<0.01%): tachycardia, atrioventricular block, atrial fibrillation, pancreatitis, seizure, Parkinson's disease (worsening). Frequency not known: restlessness, sick sinus syndrome, hepatitis, abnormal liver function tests, allergic dermatitis (disseminated), extrapyramidal symptoms, tremor, nightmares. Additional adverse reactions observed with Exelon capsules/oral solution: severe vomiting associated with oesophageal rupture (very rare); angina pectoris, myocardial infarction, duodenal ulcers (rare); confusion (common). The safety profile in patients with dementia associated with Parkinson's disease is similar to the one with Alzheimer's disease. Some ADR frequencies in Parkinson's disease and in patients with severe Alzheimer's disease are higher. Interactions: Concomitant use not recommended with metoclopramide, cholinomimetic drugs, anticholinergic medications, succinylcholine-type muscle relaxants during anesthesia. Interaction to be considered in case of concomitant use with beta-blockers. Caution is advised when rivastigmine is used in combination with other medicinal products known to prolong the QT interval.

See full prescribing information. Packs: 30's.

Note: Before prescribing, please read full prescribing information.

Tracking Number: 2022-PSB/GLC-1329-s

Release Date: 12-Dec-2022

