

**■ 듀라티얼즈안연고 (무수액체라놀린) – 3.5g**

Duratears Ointment (*Anhydrous liquid lanolin*)

**▣ 원료약품 및 그 분량**

1 g 중

주성분 : 무수액체라놀린 (별규) ..... 30mg

첨가제 : 미네랄오일, 백색바셀린

**▣ 성상**

무색의 안연고제

**▣ 효능·효과**

다음 상태에서 눈을 보호하거나 윤활하게 하기 위한 윤활 보조제

- 1) 건성 각막염(야간에 사용)
- 2) 안과 수술시, 수술하지 않은 눈의 보호, 윤활할 때
- 3) 수술후 윤활제
- 4) 안과 이외 수술시 눈을 보호, 윤활할 때

**▣ 용법·용량**

소량(0.5 cm)을 결막낭 내에 투여하거나 의사의 지시에 따라 사용한다.

**▣ 사용상의 주의사항**

**1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.**

이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응을 나타내는 사람

**2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 말 것.**

방부제 또는 세정제

**3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.**

- 1) 눈곱, 눈물, 충혈이 나타나는 사람(이 약에 과민반응이 나타날 수 있다)
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(안전성이 확립되어 있지 않다)
- 3) 수유부(모유로의 이행여부는 알려지지 않았으나 수유부에 투여하는 경우에는 영아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 말고 부득이 투여하는 경우에는

수유를 중단한다)

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.**

- 1) 눈의 통증, 불편감, 자극감, 부종(부기), 눈의 충혈, 눈물분비 증가
- 2) 2 ~ 3일간 사용하여도 증상의 개선이 보이지 않을 경우 또는 증상이 심해질 경우

**5. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항**

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 점안용으로만 사용할 것.
- 3) 이 약의 투여 전에 콘택트렌즈는 제거해야 하며 이 약 점적 30분 이후에 재착용 할 것.
- 4) 만약 다른 점안제를 동시에 사용할 경우에는 적어도 5분의 간격을 두고 투여하며 이 약을 항상 가장 나중에 사용할 것.
- 5) 사용 후에 겔제가 안구표면으로 흡수될 때까지 짧은 시간동안 시야흐림 현상이 발생할 수 있으므로 운전이나 기계조작 시 주의할 것.
- 6) 용기의 끝이 안구에 닿지 않도록 주의하여야 하며, 용기의 끝이 눈꺼풀 및 속눈썹에 닿으면 눈곱이나 곰팡이 등에 의해 약액이 오염 또는 혼탁(흐림)될 수 있으므로 주의할 것. 또한 혼탁(흐림)된 것은 사용하지 말 것.
- 7) 오염을 방지하기 위해 가능한 공동으로 사용하지 말 것.
- 8) 사용기한을 초과한 것은 사용하지 않고, 개봉한 것은 30일 이내에 사용할 것.

**6. 저장상의 주의사항**

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 잘못된 사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

**저장방법**

기밀용기, 실온보관

**최종개정년월일**

2017-08-23